



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 4/2022 del 26/05/2022

Fase fenologica. Dopo le piogge della prima settimana di maggio, condizioni di tempo stabile con buone temperature massime, hanno favorito lo sviluppo dei germogli in tutte le varietà, che stanno raggiungendo la fase di piena fioritura.

Peronospora. Le attuali condizioni meteorologiche con tempo stabile dei giorni scorsi non hanno favorito lo sviluppo di infezioni. In ogni caso, vista la fase fenologica della vite che è in pieno sviluppo e quindi caratterizzata da elevata suscettibilità alla malattia, si consiglia di vigilare sull'evoluzione delle previsioni meteo e se in scadenza il P.A. utilizzato, ripristinare la protezione prima di eventuali piogge valutando la possibilità di utilizzare prodotti ad azione sistemica (*Metalaxil, Benalaxil, Fosetil.....*) in modo da proteggere il più possibile il grappolo e la vegetazione in rapida crescita. Nel caso in cui si verificano precipitazioni su vegetazione non protetta, si consiglia di intervenire tempestivamente effettuando un trattamento (subito dopo la pioggia) con prodotti antiperonosporici che contengano anche un P.A. citotropico (*cimoxanil*).

Oidio. In presenza di infezioni ascosporiche, le attuali condizioni meteorologiche sono favorevoli allo sviluppo delle colonie e all'instaurarsi di infezioni conidiche (infezioni secondarie). In questo periodo è consigliabile l'esecuzione di monitoraggi in campo per l'individuazione tempestiva di eventuali sintomi di infezione. E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza di quello antiperonosporico (*ibe, spiroxamina, penconazolo....*), e di alternare P.A. caratterizzati da differente famiglia chimica e meccanismo d'azione.

Tignoletta. E' in atto il volo della prima generazione della tignoletta; a breve compariranno le prime larve.

Varie.

- Si raccomanda di rispettare le dosi ettaro consigliate in etichetta e di trattare con volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.
- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio o di scarso sviluppo dei germogli è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari.
- Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro fine maggio, primi di giugno per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, tecnico Co.pro.Vi., cel. **3387504596**

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano e la Società Cooperativa CO.PRO.VI di Casteggio (Pv)

LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E' COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE