



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 4/2024 del 09/05/2024

**Fase fenologica.** Continua un tempo instabile con temperature medie che si alternano fra basse e nella media stagionale che stanno condizionando lo sviluppo vegetativo. Da inizio mese sono caduti più di 50 mm di pioggia. Le temperature minime della notte sono ancora tutte sotto la media stagionale che è di 13°; le massime solo in pochi giorni hanno toccato quelle medie del periodo di 24°.

**Peronospora.** Le pregresse precipitazioni hanno favorito la germinazione delle oospore svernanti di *Plasmopara viticola* rendendo disponibile una quantità di inoculo attivo crescente e generando così condizioni di elevato rischio d'infezione in caso di nuove piogge. Rimangono validi i consigli riportati nel bollettino della settimana scorsa: tenere coperta la vegetazione senza lasciar scadere totalmente il periodo di copertura del principio attivo impiegato prendendo in considerazione l'effetto dilavante delle precipitazioni; per allungare i tempi e migliorare l'efficacia in miscela con un prodotto di copertura si può valutare la possibilità di aggiungere un p.a. **citotropico (*dimetomorf*, ...)**; in caso di pioggia allo scadere del turno e nella impossibilità di intervenire, effettuare un trattamento, subito dopo la pioggia, utilizzando prodotti antiperonosporici che contengano anche un p.a. **citotropico (*cimoxanil*)**. Bisognerà portare la massima attenzione se subentrerà un periodo di alta pressione con temperature nella media stagionale, di umidità nel terreno ne abbiamo in abbondanza, la peronospora potrebbe dimostrare una certa aggressività; servirà avere ben coperta la vegetazione. Ad oggi non ci sono segnalazioni di presenza di macchie d'olio sulla vegetazione.

**Oidio.** Anche per l'oidio rimangono validi i consigli riportati nel bollettino della settimana scorsa: eseguire un trattamento antioidico privilegiando l'impiego di prodotti a base di zolfo bagnabile a dosi medio-alte. Nei vigneti interessati da forti attacchi della malattia nell'annata precedente si consiglia l'uso di prodotti dotati di attività curativa ed eradicante (per ex. *meptyldinocap*, *spiroxamina*).

### Varie.

- E' importante rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.
- Continuare i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da P.A antiperonosporici.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 3385828793